

## Domácí cvičení 3

Funkce dvou proměnných - Tečná rovina a Taylorův polynom  
29. 2. 2024

1) Sestavte rovnici tečné roviny (Taylorův polynom 1. stupně) pro funkci

a)  $f(x, y) = x^3y - xy^2 + 2xy - x^2 - 5x + 1$  v bodě  $A = [1, 2]$

b)  $f(x, y) = \frac{e^{3x}}{x^2 + xy + y^2}$  v bodě  $A = [0, 1]$

c)  $f(x, y) = \operatorname{tg} \frac{x}{1+x^2+y^2}$  v bodě  $A = [0, 1]$

d)  $f(x, y) = \cos(x + y) \sin(x - y)$  v bodě  $A = [\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

e)  $f(x, y) = \ln \frac{xy}{x+y}$ , aby byla rovnoběžná s rovinou  $x + y - 2z + 3 = 0$ .

f)  $f(x, y) = \operatorname{arccotg} \frac{x}{1+\sqrt{y}}$ , aby byla kolmá na přímkou procházející body  $[2, 3, 7]$  a  $[1, 3, 4]$ .

2) Sestavte rovnici Taylorův polynom 2. stupně funkce

a)  $f(x, y) = \frac{\cos x}{1+\sin y}$  v bodě  $A = [0, 0]$

b)  $f(x, y) = \operatorname{tg}(2x + 3y)$  v bodě  $A = [0, 0]$

3) Sestavte rovnici Taylorův polynom 3. stupně funkce

a)  $f(x, y) = 6 \sin x \cos y$  v bodě  $A = [0, 0]$

b)  $f(x, y) = e^{x^2 - y^2}$  v bodě  $A = [0, 0]$

b)  $f(x, y) = 6e^{-x} \ln(1 + y)$  v bodě  $A = [0, 0]$

4) Pomocí Taylorova polynomu 2. stupně k vhodně zvolené funkci ve vhodně zvoleném bodě vypočítejte přibližnou hodnotu čísel

a)  $3e^{0,02} \ln 0,95$

b)  $1,03^8 \operatorname{arctg} 0,1$

c)  $\ln \sqrt{0,96^2 + 0,03^2}$

d)  $e^{0,04} \cos^2 0,02$

Výsledky:

1)

a)  $z = -x - y$

b)  $z = 2x - 2y + 3$

c)  $z = \frac{1}{2}x$

d)  $z = -x + y$

e)  $z = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2} - 1 - \ln 2$

f)  $z = -\frac{1}{3}x + \frac{\pi}{2}$

2)

a)  $\mathbf{T}_{f,A}^2(x, y) = 1 - y - \frac{1}{2}x^2 + y^2$

b)  $\mathbf{T}_{f,A}^2(x, y) = 2x + 3y$

3)

a)  $\mathbf{T}_{f,A}^3(x, y) = 6x - x^3 - 3xy^2$

b)  $\mathbf{T}_{f,A}^3(x, y) = 1 + x^2 - y^2$

c)  $\mathbf{T}_{f,A}^3(x, y) = 6y - 6xy - 3y^2 + 3x^2y + 3xy^2 + 2y^3$

4)

a) Pro funkci  $f(x, y) = 3e^x \ln y$  v bodě  $A = [0, 1]$  je:

$$\mathbf{T}_{f,A}^2(x, y) = 3(y - 1) + 3x(y - 1) - \frac{3}{2}(y - 1)^2,$$

z čehož dostaneme

$$3e^{0,02} \ln 0,95 \doteq -0,15675$$

b) Pro funkci  $f(x, y) = x^8 \arctg y$  v bodě  $A = [1, 0]$  je:

$$\mathbf{T}_{f,A}^2(x, y) = y + 8y(x - 1),$$

z čehož dostaneme

$$1,03^8 \arctg 0,1 \doteq 0,124$$

c) Pro funkci  $f(x, y) = \frac{1}{2} \ln x^2 + y^2$  v bodě  $A = [1, 0]$  je:

$$\mathbf{T}_{f,A}^2(x, y) = x - 1 - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \frac{y^2}{2},$$

z čehož dostaneme

$$\ln \sqrt{0,96^2 + 0,03^2} \doteq -0,04035$$

d) Pro funkci  $f(x, y) = e^x \cos^2 y$  v bodě  $A = [0, 0]$  je:

$$\mathbf{T}_{f,A}^2(x, y) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 - y^2,$$

z čehož dostaneme

$$e^{0,04} \cos^2 0,02 \doteq 1,0404$$